

Az akác irtása a Dél-Nyírségben 2013

Demeter László



Alkalmazott módszerek:

1. Egyszerű kivágás, majd legeltetés
2. Fúrásos vegyszeres kezelés (nagy fák esetén)
3. Vágáslap vegyszeres lekenése, ill. kéreghántás lekenés (kisebb sarjaknál)
4. Pontpermetezés (kiegészítő módszer)



Martinkai-legelő 2004



Kivágás utáni legeltetés:

Először 2003-ban Nyírábrányban próbálkoztunk vele kb. 2 hektáron. Juh legelte folyamatosan. A módszer tökéletesen bevált. Azóta folyamatosan alkalmazzuk a homoki legelőkön, egyszerre max. 2-3 ha kiterjedésben.

Juh és szarvasmarha egyaránt bevált. Intenzív legelés mellett átlagos időjárás esetén 2 év alatt teljesen kipusztulhat.

Martinkai-legelő 2008



Martinkai-legelő 2012



Martinkai-legelő 2011



Nem várt eredmény: orrszarvúbogár, óriás tűrösdarázs.

Fúrásos vegyszeres kezelés:

2002-ben kezdtük alkalmazni a módszert nagyobb kiterjedésben az Állóhegyi-tölgyes helyreállításában. Ott használjuk, ahol a legeltetés nem megoldható (pl. őshonos erdőállományokban, védett növények élőhelyén, nem legeltetett homoki gyepeken).

- Glifozát hatóanyagú vegyszereket használunk: Medallon, Fozát, Glifos.
- Kipróbáltunk néhány hígítást. A 2x-es hígítás még kb. hasonló hatást eredményezett, mint a tömény vegyszer.
- Általában 8-as fúrószárat használunk, lehetőleg húr irányban fúrva, 10-15 cm-enként a törzsön körben.

Legjobb eredményt a nyár második felében kaptunk. Lehetőleg várunk egy-két hónapot, vagy megvárjuk a következő vegetációs időszakot és az újra kihajtó fákon újabb kezelést végzünk a letermelés előtt.



Vágáslap vegyszeres lekenése, illetve kéreghántás lekenéssel

Kisebb sarjak (4-5 cm-ig) kezelésére használjuk, gyakran az előző módszer kiegészítésére. Nagy fáknál nálunk nem vált be, mert a gyökérsarjak képződését nem akadályozta meg.

Általában tömény vegyszert alkalmazunk.

A nyár második felében, illetve aszályos időben igazán hatásos.

Pontpermetezés/permetezés

Akácnál ritkán használjuk:

- a sarjak elégtelen legeltetése miatt,
- a fűrés hibáinak utókezelésére,
- teljes talajelőkészítéssel végzett erdőfelújításban a tuskóprizma kezelésére.

A vegyszer hígítása a használati útmutató szerinti 3,5-5%. Fontos a tapadássegítő szer használata (Nonit, Silvet).